





**CONCURSO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

---

**ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuiv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TODO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site [concursopublico.uniuv.edu.br](http://concursopublico.uniuv.edu.br) a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuiv,  
[concursopublico.uniuv.edu.br](http://concursopublico.uniuv.edu.br), **a partir das 17h do dia 2 de fevereiro de 2015.**

---



**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁVA**

1. Uma gestante começou a apresentar dores em região de baixo ventre. Procurou assistência médica, sendo realizado um ultrassom e lhe foi comunicado que estava em trabalho de parto e que o recém-nascido seria prematuro. Qual é a alternativa correta, que define antes de qual semana de gestação trata-se de um parto prematuro?
  - A ( ) 18 semanas de gestação;
  - B ( ) 20 semanas de gestação;
  - C ( ) 36 semanas de gestação;
  - D ( ) 37 semanas de gestação;
  - E ( ) 38 semanas de gestação.
2. A secreção eliminada via transvaginal, no período do puerpério, é denominada de loquiação. O enfermeiro tem o papel de observar as características dessa secreção e de também orientar a puérpera sobre isso. Quais são as características a serem observadas da loquiação?
  - A ( ) Quantidade, temperatura e viscosidade;
  - B ( ) Quantidade, temperatura e odor;
  - C ( ) Quantidade, coloração e viscosidade;
  - D ( ) Quantidade, coloração e odor;
  - E ( ) Quantidade, coloração e temperatura.
3. O enfermeiro, ao realizar um exame físico de um paciente na sala de emergência, observa o sinal de Brudzinski. Isso pode ser um indicativo de:
  - A ( ) Hemorragia subdural;
  - B ( ) Doença de Alzheimer;
  - C ( ) Meningite;
  - D ( ) Hemorragia epidural;
  - E ( ) Hematoma subdural.
4. A fenilcetonúria (PKU) é uma doença diagnosticada em 1 a cada 15.000 recém-nascidos. Sobre essa doença é correto afirmar:
  - A ( ) A PKU é um erro inato do metabolismo, causado pela deficiência de um aminoácido não essencial, denominado fenilalanina;
  - B ( ) Na PKU a enzima fenilalanina hidroxilase está deficiente e isso resulta no acúmulo de fenilalanina na urina;
  - C ( ) Um dos metabólitos da fenilalanina, o ácido fenil acético, confere o odor de “bolor” à urina;
  - D ( ) Para a detecção dos níveis de fenilalanina no RN, utiliza-se o Teste da Orelhinha;
  - E ( ) A criança com PKU apresenta um quadro clássico de prostração e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
5. De acordo com a ANVISA, o sistema de precauções consiste na prevenção da transmissão de um micro-organismo de um paciente para outro, ou para um profissional da saúde. Marque a alternativa que previne a transmissão da patologia ao respectivo sistema de precaução:
  - 1) Pseudomonas multirresistente;
  - 2) Meningite por Haemophilus influenza;
  - 3) Tuberculose;
  - 4) Hepatite B.
  - A ( ) 1 – Contato, 2 – Aerossóis, 3 – Aerossóis, 4 – Contato;
  - B ( ) 1 – Contato, 2 – Respiratória, 3 – Gotículas, 4 – Padrão;
  - C ( ) 1 – Contato, 2 – Gotículas, 3 – Aerossóis, 4 – Padrão;
  - D ( ) 1 – Padrão, 2 – Contato, 3 – Aerossóis, 4 – Contato;
  - E ( ) 1 – Padrão, 2 – Contato, 3 – Gotículas, 4 – Contato.



**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA**

6. A Eritroblastose, ou doença de Rhesus, é uma doença de incompatibilidade sanguínea diagnosticada no feto. Esse fenômeno ocorre na seguinte condição, em relação ao fator Rh da mãe, do feto e do pai, respectivamente:
- A ( ) Rh+, Rh+ e Rh+  
B ( ) Rh+, Rh+ e Rh-  
C ( ) Rh-, Rh+ e Rh+  
D ( ) Rh-, Rh+ e Rh-  
E ( ) Rh+, Rh- e Rh-
7. O trabalho de parto é dividido em períodos e com atividades de cuidado de enfermagem específica em cada um deles. Qual afirmativa descreve os períodos clínicos do parto?
- A ( ) Dilatação, descida, rotação interna, insinuação, expulsão;  
B ( ) Acomodação, insinuação, descida, expulsão e pós-parto imediato;  
C ( ) Dilatação, descida, insinuação e expulsão;  
D ( ) Dilatação, expulsão, secundamento e pós-parto imediato;  
E ( ) Dilatação, secundamento, insinuação e pós-parto imediato.
8. O toque vaginal é um procedimento da competência do enfermeiro obstetra, regulamentado pela resolução COFEN 223, de 03 de dezembro de 1999. Esse procedimento é muito importante para avaliar a evolução do trabalho de parto. Contudo, por que ele deve ser evitado até que a gestante esteja em franco trabalho de parto?
- A ( ) Para minimizar os riscos de ruptura da bolsa de águas;  
B ( ) Para minimizar os riscos de infecção ovular e puerperal;  
C ( ) Para minimizar os riscos de lesão no polo cefálico do feto;  
D ( ) Para minimizar os riscos de infecção no feto;  
E ( ) Para minimizar os riscos de acelerar a evolução de um falso trabalho de parto.
9. Um paciente foi admitido no bloco cirúrgico, com o diagnóstico de obstrução biliar. De acordo com o Ministério da Saúde, Portaria n. 2616, as cirurgias são classificadas de acordo com o seu potencial de contaminação na incisão cirúrgica. Durante o transoperatório dessa cirurgia, ocorreu uma falha técnica discreta. Nesse contexto, como é classificado o potencial de contaminação dessa cirurgia?
- A ( ) Limpa;  
B ( ) Potencialmente contaminada;  
C ( ) Contaminada;  
D ( ) Infectada;  
E ( ) Colonizada.



**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ**

10. Em relação ao parto de uma mulher portadora de HIV e assistência ao recém-nascido, assinale com (V) a sentença verdadeira e com (F) a falsa.

I ( ) Não romper artificialmente as membranas amnióticas;

II ( ) Realizar o toque vaginal de 4/4 horas;

III ( ) Proceder o clameamento do cordão umbilical, imediatamente após a expulsão do neonato;

IV ( ) Dar o banho no recém-nascido, com água e sabão, 6 horas após o nascimento.

Após a análise das sentenças, marque a alternativa correta:

A ( ) V, V, F e F;

B ( ) V, F, F e V;

C ( ) V, V, V e F;

D ( ) V, F, V e F;

E ( ) F, F, V e V.

11. A Norma Regulamentadora 32 – NR32 visa estabelecer as diretrizes básicas para implementação de medidas de segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde. Qual afirmativa não está de acordo com as diretrizes estabelecidas na NR32?

A ( ) Todo trabalhador com possibilidade de exposição a agentes biológicos deve utilizar vestimenta de trabalho adequada e esta deve ser fornecida sem ônus para o empregado;

B ( ) O empregador deve providenciar recipientes e meios de transporte adequados para materiais infectantes, fluidos e tecidos orgânicos;

C ( ) Em locais com possibilidade de exposição a agentes biológicos, devem ser fornecidas aos trabalhadores instruções verbais, em linguagem acessível, das rotinas realizadas no local de trabalho e medidas de prevenção de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho;

D ( ) Quando expostos a algum agente biológico, os trabalhadores devem comunicar, imediatamente, o acidente ou incidente;

E ( ) Trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortantes devem ser os responsáveis pelo seu descarte.

12. A bolsa amniótica é uma barreira protetora para o feto. Quando ela se rompe, é importante observar as características do líquido amniótico, principalmente, quanto à coloração, odor e presença de grumos. Esses aspectos indicam a maturidade fetal e presença de sofrimento fetal. Qual é o nome dado à ruptura espontânea da bolsa amniótica?

A ( ) Amniotomia;

B ( ) Amniocentese;

C ( ) Amniorex;

D ( ) Amniorreia;

E ( ) Amnion abrupta.

13. As imunoglobulinas são moléculas proteicas produzidas pelos linfócitos B, que têm a função de defesa do organismo contra os antígenos. Considerando um dos principais fatores, o baixo peso molecular, qual imunoglobulina atravessa a barreira transplacentária e confere ao recém-nascido imunidade nas primeiras semanas de vida?

A ( ) IgA;

B ( ) IgE;

C ( ) IgM;

D ( ) IgG;

E ( ) IgD.



**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁVA**

- 
14. A icterícia é uma manifestação frequente no período neonatal, sendo classificada em fisiológica e patológica. O diagnóstico de icterícia nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido pode estar relacionado a:
- A ( ) Insuficiência renal;
  - B ( ) Insuficiência hepática;
  - C ( ) Imaturidade hepática;
  - D ( ) Incompatibilidade sanguínea;
  - E ( ) Insuficiência cardíaca.
15. Um lactente foi hospitalizado com um diagnóstico de pneumonia. A prescrição médica solicitava administrar 250 mg de cefalotina, pela via intravenosa, de 6/6 horas. No posto de enfermagem existem frascos do medicamento contendo 1g, e ampolas de soro fisiológico 0,9% de 10 ml, e bolsa de soro glicosado 5% de 500 ml. Quantos ml dessa cefalosporina de primeira geração serão administrados em um período de 24 horas?
- A ( ) 2,5 ml;
  - B ( ) 5,0 ml;
  - C ( ) 7,5 ml;
  - D ( ) 10,0 ml;
  - E ( ) 500 ml
16. Nas consultas de puericultura é importante avaliar os reflexos do recém-nascido, a fim de verificar a evolução do desenvolvimento. O processo de desenvolvimento neuropsicomotor do recém-nascido é avaliado por meio de vários reflexos. Qual idade tinha o lactente que o enfermeiro não conseguiu mais avaliar o reflexo de Moro? Assinale a alternativa que responde à pergunta:
- A ( ) 15 dias de vida;
  - B ( ) Um mês de vida;
  - C ( ) Dois meses de vida;
  - D ( ) Três meses de vida;
  - E ( ) Seis meses de vida.
17. A enfermeira Sister Callista Roy contribuiu para a construção da ciência da enfermagem por meio de qual Teoria de Enfermagem? Assinale a alternativa que responde à pergunta:
- A ( ) Teoria Ambiental;
  - B ( ) Teoria das Necessidades Humanas Básicas;
  - C ( ) Teoria das Relações Interpessoais;
  - D ( ) Teoria da Adaptação;
  - E ( ) Teoria do Autocuidado.
18. As características do líquido amniótico são importantes aspectos para diagnosticar o sofrimento fetal. Qual a cor característica que evidencia essa situação? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A ( ) Alaranjado;
  - B ( ) Avermelhado;
  - C ( ) Límpido;
  - D ( ) Esverdeado;
  - E ( ) Transparente.
-



**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAIÁ**

19. Durante a internação de uma criança com diagnóstico suspeito de tuberculose, foi prescrita a realização da prova da tuberculina (Teste de Mantoux). A tuberculina deve ser administrada por via \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A ( ) Intravenosa;  
B ( ) Intramuscular;  
C ( ) Subcutânea;  
D ( ) Intradérmica;  
E ( ) Intrapleural.
20. Um pré-escolar foi admitido na unidade de internação pediátrica, com um diagnóstico de uma patologia decorrente da substituição do ácido glutâmico pela valina em uma cadeia de aminoácidos. O resultado do seu hemograma indicava Hb 7g/dl, sendo administrado 400 ml de concentrado de glóbulos. No exame de sangue seguinte foi verificado que a transfusão não apresentou efeito satisfatório. Diante desse quadro, podemos raciocinar que \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna:
- A ( ) A criança está apresentando crises vasclusivas generalizadas;  
B ( ) O não aumento da Hb está associado a uma crise aplásica;  
C ( ) Os glóbulos vermelhos administrados não correspondiam com os da criança;  
D ( ) A criança está apresentando uma crise de sequestro;  
E ( ) A criança está apresentando uma crise hepática.
21. A atonia uterina relacionada à hemorragia pós-parto é uma causa importante de mortalidade materna. Qual o cuidado relacionado à massagem uterina que deve ser realizado por um profissional qualificado, no terceiro período do parto, para a prevenção da hemorragia pós-parto? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A ( ) Massagem uterina realizada imediatamente após a expulsão do feto;  
B ( ) Massagem uterina realizada imediatamente após o clameamento do cordão umbilical;  
C ( ) Massagem uterina realizada imediatamente após expulsão da placenta e a cada 30 minutos durante as primeiras duas horas;  
D ( ) Massagem uterina realizada imediatamente após expulsão da placenta e a cada 15 minutos durante as primeiras duas horas;  
E ( ) Massagem uterina realizada imediatamente após expulsão do feto e a cada 30 minutos durante as primeiras três horas.
22. A punção lombar consiste na inserção de uma agulha na parte inferior do canal medular, normalmente, entre a quarta e a quinta vértebra lombar. O objetivo desse procedimento é a coleta de líquido cefalorraquidiano, para provas diagnósticas. Qual afirmação está incorreta, em relação ao resultado do líquido cefalorraquidiano coletado? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A ( ) A aparência turva pode indicar presença de bactéria e uma infecção do cérebro;  
B ( ) A aparência turva pode indicar presença de bactéria e uma infecção da medula espinhal;  
C ( ) Valores elevados de proteína podem ser indicativo da síndrome de Guillain-Barré;  
D ( ) A concentração de glicose anormalmente alta indica uma infecção das meninges;  
E ( ) A presença de sangue no líquido cefalorraquidiano pode ser um indicativo de hemorragia cerebral.



**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIÁVA**

23. A Organização Mundial da Saúde incentiva o aleitamento materno exclusivo até a idade de 6 meses. Após essa faixa etária, inicia-se alimentação complementar. De acordo com Ministério da Saúde, a partir de que idade a criança já pode receber a alimentação básica da família, desde que não sejam utilizados temperos industrializados, excesso de sal, pimenta, alimentos gordurosos como bacon, banha, linguiça, entre outros. Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A ( ) 6 meses;  
B ( ) 7 meses;  
C ( ) 8 meses;  
D ( ) 9 meses;  
E ( ) 10 meses.
24. A vacina inativada contra poliomielite (VIP) foi implantada pelo Ministério da Saúde no 2º semestre de 2012, sendo composta por poliovírus inativado tipos I, II e III. Essa vacina visa prevenir a reintrodução do vírus selvagem e o ressurgimento da poliomielite. Ela deve ser administrada por via IM, preferencialmente, no músculo vasto lateral da coxa ou região ventroglútea, na(s) seguinte(s) idade(s):
- A ( ) Ao nascimento;  
B ( ) Aos 2 meses;  
C ( ) Aos 2 meses e aos 4 meses;  
D ( ) Aos 2 meses; 4 meses e 6 meses;  
E ( ) Aos 2 meses; 4 meses; 6 meses e reforço com 15 meses.
25. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) definem o Sistema de Informação em Saúde – SIS, como um conjunto de componentes que atuam de forma integrada, por meio de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação de saúde. Qual o principal objetivo da utilização dos SIS nos serviços de saúde? Assinale a alternativa que responde corretamente à pergunta:
- A ( ) Promover as instituições de serviços de saúde;  
B ( ) Divulgar os resultados de pesquisas embasadas no método epidemiológico;  
C ( ) Buscar financiamento para os serviços de saúde;  
D ( ) Subsidiar o planejamento, financiamento, provisão e avaliação dos serviços de saúde;  
E ( ) Divulgar e orientar a população sobre os cuidados de saúde em uma epidemia.